

**WYPEŁNIA ZDAJĄCY**

**KOD**

--	--	--

**PESEL**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Miejsce na naklejkę.**

Sprawdź, czy kod na naklejce to

**E-100.**

Jeżeli tak – przyklej naklejkę.  
Jeżeli nie – zgłoś to nauczycielowi.

**EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI  
POZIOM PODSTAWOWY**

DATA: **23 sierpnia 2022 r.**

GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**

CZAS PRACY: **170 minut**

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **45**

**WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY**



Uprawnienia zdającego do:

- nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę
- dostosowania zasad oceniania
- dostosowania w zw. z dyskalkulią.



EMAP-P0-**100**-2208

**Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 25 stron (zadania 1–35).  
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
3. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
4. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.
5. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–28) zaznacz na karcie odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.
6. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (29–35) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.
7. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.
8. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
9. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
10. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego.

W każdym z zadań od 1. do 28. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.

**Zadanie 1. (0–1)**

Liczba  $\frac{8^{-40}}{2^{10}}$  jest równa

- A.  $4^{-4}$                       B.  $4^{-50}$                       C.  $2^{-47}$                       D.  $2^{-130}$

**Zadanie 2. (0–1)**

Liczba  $\log_2 32 - \log_2 8$  jest równa

- A. 2                              B. 14                              C. 16                              D. 24

**Zadanie 3. (0–1)**

Liczba  $(5 - 2\sqrt{3})^2$  jest równa

- A.  $25 + 4\sqrt{3}$                       B.  $25 - 4\sqrt{3}$                       C.  $37 + 20\sqrt{3}$                       D.  $37 - 20\sqrt{3}$

**Zadanie 4. (0–1)**

Cenę  $x$  (w złotych) pewnego towaru obniżono najpierw o 30%, a następnie obniżono o 20% w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie. Po obydwu tych obniżkach cena towaru jest równa


- A.  $0,36 \cdot x$  złotych.                      B.  $0,44 \cdot x$  złotych.  
C.  $0,50 \cdot x$  złotych.                      D.  $0,56 \cdot x$  złotych.

**Zadanie 5. (0–1)**

Jednym z rozwiązań równania  $5(x + 1) - x^2(x + 1) = 0$  jest liczba

- A. 1                              B. (-1)                              C. 5                              D. (-5)

## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



**Zadanie 6. (0–1)**

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności  $\frac{8x-3}{4} > 6x$  jest przedział

- A.  $(-\infty, -\frac{3}{4})$       B.  $(-\frac{3}{4}, +\infty)$       C.  $(-\infty, -\frac{3}{16})$       D.  $(-\frac{3}{16}, +\infty)$

**Zadanie 7. (0–1)**

Suma wszystkich rozwiązań równania  $(2x - 1)(2x - 2)(x + 2) = 0$  jest równa

- A.  $(-\frac{7}{2})$       B.  $(-\frac{1}{2})$       C.  $\frac{1}{2}$       D. 1

**Zadanie 8. (0–1)**

Punkt  $A = (1, 2)$  należy do wykresu funkcji  $f$ , określonej wzorem

$f(x) = (m^2 - 3)x^3 - m^2 + m + 1$  dla każdej liczby rzeczywistej  $x$ . Wtedy

- A.  $m = -4$       B.  $m = -2$       C.  $m = 0$       D.  $m = 4$

**Zadanie 9. (0–1)**

Funkcja liniowa  $f$  określona wzorem  $f(x) = (2m - 5)x + 22$  jest rosnąca dla


- A.  $m > \frac{2}{5}$       B.  $m > 2,5$       C.  $m > 0$       D.  $m > 2$

**Zadanie 10. (0–1)**

Funkcja kwadratowa  $f$  określona wzorem  $f(x) = x^2 + bx + c$  osiąga dla  $x = 2$  wartość najmniejszą równą 4. Wtedy

- A.  $b = -4, c = 8$       B.  $b = 4, c = -8$   
C.  $b = -4, c = -8$       D.  $b = 4, c = 8$

## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)




**Zadanie 11. (0–1)**

Dana jest funkcja kwadratowa  $f$  określona wzorem  $f(x) = -2(x - 2)(x + 1)$ . Funkcja  $f$  jest rosnąca w zbiorze

- A.  $(-\infty, \frac{1}{2})$       B.  $(-1, 2)$       C.  $(0, \frac{5}{2})$       D.  $(\frac{5}{2}, +\infty)$

**Zadanie 12. (0–1)**

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji  $f$  określonej na zbiorze  $\langle -2, 5 \rangle$ .



Funkcja  $g$  jest określona za pomocą funkcji  $f$  następująco:  $g(x) = f(x - 1)$ . Wykres funkcji  $g$  można otrzymać poprzez odpowiednie przesunięcie wykresu funkcji  $f$ . Dziedziną funkcji  $g$  jest zbiór


- A.  $\langle 0, 2 \rangle$       B.  $\langle -1, 6 \rangle$       C.  $\langle -3, 4 \rangle$       D.  $\langle 1, 3 \rangle$

**Zadanie 13. (0–1)**

Dane są ciągi  $a_n = 3n$  oraz  $b_n = 4n - 2$ , określone dla każdej liczby naturalnej  $n \geq 1$ . Liczba 10

- A. jest wyrazem ciągu  $(a_n)$  i jest wyrazem ciągu  $(b_n)$ .  
 B. jest wyrazem ciągu  $(a_n)$  i nie jest wyrazem ciągu  $(b_n)$ .  
 C. nie jest wyrazem ciągu  $(a_n)$  i jest wyrazem ciągu  $(b_n)$ .  
 D. nie jest wyrazem ciągu  $(a_n)$  i nie jest wyrazem ciągu  $(b_n)$ .

**BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 14. (0–1)**

Dany jest ciąg geometryczny  $(a_n)$ , określony dla każdej liczby naturalnej  $n \geq 1$ . Drugi wyraz tego ciągu oraz iloraz ciągu  $(a_n)$  są równe 2. Suma pięciu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa

- A. 1                      B. 11                      C. 21                      D. 31

**Zadanie 15. (0–1)**

W ciągu dwóch godzin trzy jednakowe maszyny produkują razem 1200 guzików. Ile guzików wyprodukuje pięć takich maszyn w ciągu jednej godziny? Przyjmij, że maszyny pracują z taką samą, stałą wydajnością.

- A. 800                      B. 900                      C. 1000                      D. 1500

**Zadanie 16. (0–1)**

Przyprostokątna  $AC$  trójkąta prostokątnego  $ABC$  ma długość 6, a przeciwprostokątna  $AB$  ma długość  $3\sqrt{5}$ . Wtedy tangens kąta ostrego  $CAB$  tego trójkąta jest równy

- A.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$                       B.  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$                       C.  $\frac{1}{2}$                       D. 2


**Zadanie 17. (0–1)**

Nie istnieje kąt ostry  $\alpha$  taki, że

- A.  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$  i  $\cos \alpha = \frac{2}{3}$                       B.  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$  i  $\cos \alpha = \frac{12}{13}$   
C.  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$  i  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$                       D.  $\sin \alpha = \frac{9}{15}$  i  $\cos \alpha = \frac{12}{15}$




## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



**Zadanie 18. (0–1)**

Wierzchołki  $A, B, C$  czworokąta  $ABSC$  leżą na okręgu o środku  $S$ . Kąt  $ABS$  ma miarę  $40^\circ$  (zobacz rysunek), a przekątna  $BC$  jest dwusieczną tego kąta.




Miara kąta  $ASC$  jest równa

- A.  $30^\circ$                       B.  $40^\circ$                       C.  $50^\circ$                       D.  $60^\circ$

**Zadanie 19. (0–1)**


Punkty  $A$  oraz  $B$  leżą na okręgu o środku  $S$ . Kąt środkowy  $ASB$  ma miarę  $100^\circ$ . Prosta  $l$  jest styczna do tego okręgu w punkcie  $A$  i tworzy z cięciwą  $AB$  okręgu kąt o mierze  $\alpha$  (zobacz rysunek).



Wtedy

- A.  $\alpha = 40^\circ$                       B.  $\alpha = 45^\circ$                       C.  $\alpha = 50^\circ$                       D.  $\alpha = 60^\circ$

**BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 20. (0–1)**

Pole prostokąta jest równe 16, a przekątne tego prostokąta przecinają się pod kątem ostrym  $\alpha$ , takim, że  $\sin \alpha = 0,2$ . Długość przekątnej tego prostokąta jest równa

- A.  $4\sqrt{5}$                       B.  $4\sqrt{10}$                       C. 80                      D. 160

**Zadanie 21. (0–1)**

Proste o równaniach  $y = \frac{2}{3}x - 3$  oraz  $y = (2m - 1)x + 1$  są prostopadłe, gdy

- A.  $m = -\frac{5}{4}$                       B.  $m = -\frac{1}{4}$                       C.  $m = \frac{5}{6}$                       D.  $m = \frac{5}{4}$

**Zadanie 22. (0–1)**

Punkty  $A = (1, -3)$  oraz  $C = (-2, 4)$  są końcami przekątnej  $AC$  rombu  $ABCD$ . Środek przekątnej  $BD$  tego rombu ma współrzędne

- A.  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$                       B.  $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$                       C.  $(-1, 2)$                       D.  $(-1, 1)$

**Zadanie 23. (0–1)**

Punkty  $A = (-6, 5)$ ,  $B = (5, 7)$ ,  $C = (10, -3)$  są wierzchołkami równoległoboku  $ABCD$ . Długość przekątnej  $BD$  tego równoległoboku jest równa


- A.  $3\sqrt{5}$                       B.  $4\sqrt{5}$                       C.  $6\sqrt{5}$                       D.  $8\sqrt{5}$

**Zadanie 24. (0–1)**

Obrazem prostej o równaniu  $y = 2x + 5$  w symetrii osiowej względem osi  $Ox$  jest prosta o równaniu

- A.  $y = 2x - 5$                       B.  $y = -2x - 5$   
C.  $y = -2x + 5$                       D.  $y = 2x + 5$

## BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)



**Zadanie 25. (0–1)**

W graniastopie prawidłowym stosunek liczby wszystkich krawędzi do liczby wszystkich ścian jest równy  $7 : 3$ . Podstawą tego graniastopu jest

- A. trójkąt.
- B. pięciokąt.
- C. siedmiokąt.
- D. ośmiokąt.

**Zadanie 26. (0–1)**

Średnia arytmetyczna zestawu liczb  $a, b, c, d$  jest równa 20. Wtedy średnia arytmetyczna zestawu liczb  $a - 10, b + 30, c, d$  jest równa

- A. 10
- B. 20
- C. 25
- D. 30

**Zadanie 27. (0–1)**

Wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych większych od 300 o wszystkich cyfrach parzystych jest


- A.  $6 \cdot 10 \cdot 10$
- B.  $3 \cdot 10 \cdot 10$
- C.  $6 \cdot 5 \cdot 5$
- D.  $3 \cdot 5 \cdot 5$

**Zadanie 28. (0–1)**

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ścianie ma inną liczbę oczek – od jednego do sześciu. Niech  $p$  oznacza prawdopodobieństwo otrzymania w drugim rzucie liczby oczek podzielnej przez 3. Wtedy

- A.  $p = \frac{1}{18}$
- B.  $p = \frac{1}{6}$
- C.  $p = \frac{1}{3}$
- D.  $p = \frac{2}{3}$


**BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 29. (0–2)**

Rozwiąż nierówność


$$3x^2 - 8x \geq 3$$





**Zadanie 30. (0–2)**

Trójwyrazowy ciąg  $(x, y - 4, y)$  jest arytmetyczny. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 6. Oblicz wszystkie wyrazy tego ciągu.




Wypełnia egzaminator	Nr zadania	29.	30.
	Maks. liczba pkt	2	2
	Uzyskana liczba pkt		

**Zadanie 31. (0–2)**

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej  $a$  różnej od 0 i każdej liczby rzeczywistej  $b$  różnej od 0 spełniona jest nierówność


$$2a^2 - 4ab + 5b^2 > 0$$



**Zadanie 32. (0–2)**

Rozwiąż równanie


$$\frac{4}{x+2} = x - 1$$



Wypełnia egzaminator	Nr zadania	31.	32.
	Maks. liczba pkt	2	2
	Uzyskana liczba pkt		

**Zadanie 33. (0–2)**


Dany jest trójkąt równoboczny  $ABC$  o boku długości 24. Punkt  $E$  leży na boku  $AB$ , a punkt  $F$  – na boku  $BC$  tego trójkąta. Odcinek  $EF$  jest równoległy do boku  $AC$  i przechodzi przez środek  $S$  wysokości  $CD$  trójkąta  $ABC$  (zobacz rysunek). Oblicz długość odcinka  $EF$ .



**Zadanie 34. (0–2)**

Ze zbioru pięciu liczb  $\{-5, -4, 1, 2, 3\}$  losujemy kolejno ze zwracaniem dwa razy po jednej liczbie. Zdarzenie  $A$  polega na wylosowaniu dwóch liczb, których iloczyn jest ujemny.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia  $A$ .





Wypełnia egzaminator	Nr zadania	33.	34.
	Maks. liczba pkt	2	2
	Uzyskana liczba pkt		

**Zadanie 35. (0–5)**


Dany jest graniastosłup prosty  $ABCDEFGH$ , którego podstawą jest prostokąt  $ABCD$ . W tym graniastosłupie  $|BD| = 15$ , a ponadto  $|CD| = 3 + |BC|$  oraz  $|\sphericalangle CDG| = 60^\circ$  (zobacz rysunek).

Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa.




<b>Wypełnia egzaminator</b>	<b>Nr zadania</b>	<b>35.</b>
	<b>Maks. liczba pkt</b>	<b>5</b>
	<b>Uzyskana liczba pkt</b>	

**BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**







Więcej znajdziesz na <https://paulinaodmatematyki.com>

Więcej znajdziesz na <https://paulinaodmatematyki.com>

Więcej znajdziesz na <https://paulinaodmatematyki.com>